



**ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΩΝ ΕΜ**

ΟΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 15, Τ.Κ. 38221 ΒΟΛΟΣ
Τηλ: 6978 288 264, ΦΑΞ: 24260 23733
Email: info@oiko-em.gr www.oiko-em.gr

4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ

- Απλώνουμε στο έδαφος Μποκάσι, 450-600 gram περίπου ανά m².
- Στη συνέχεια ψεκάζουμε με ΕΜα, αραιωμένο με νερό σε αναλογία 1: 100 και σκεπάζουμε με ελαφρύ σκάλισμα το Μποκάσι 5-10 εκατοστά στο χώμα.
- Περιμένουμε 2 εβδομάδες για να ενσωματωθεί το Μποκάσι στο χώμα γιατί είναι όξινο. Όταν φυτέψουμε πασπαλίζουμε το έδαφος γύρω από κάθε φυτό με μισό κουταλάκι σκόνη κεραμικών (Keramikpulver) αναμειγμένη με σκόνη πέτρας (την οποία μπορούμε να προμηθευτούμε από κοντινό νταμάρι ή από εργαστήριο επεξεργασίας πέτρας) ή με Βαζάλη.
- Στη συνέχεια ποτίζουμε κάθε εβδομάδα τα φυτά με ΕΜα (π.χ. σε 10 λίτρα νερό 0,5 λίτρα ΕΜα). Κατά προτίμηση ποτίζουμε το σούρουπο ή πριν μία βροχή που περιμένουμε.

Για αρρώστειες: ψεκάζουμε με ΕΜ5 (σε αναλογία με νερό πάνω από 1:100) τα φυτά και τα άρρωστα φύλλα τους, προσέχοντας να μη βραχούν τα άνθη που δεν έχουν δέσει ακόμα (το ίδιο προσέχουμε και κατά το πότισμα με ΕΜα).

Επίσης: αφαιρούμε τα χαμηλά κλωναράκια-φύλλα του φυτού και με αυτά σκεπάζουμε το έδαφος γύρω από το φυτό.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΤΑΤΑΣ ΜΕ ΕΜ

- **Προετοιμασία του σπόρου:** σε ζεστό και υγρό μέρος βάζουμε τον παταόσπορο μέσα σε καλό και ελαφρύ χούμο. Όταν αποκτήσει ριζούλες και φυλλαράκια είναι έτοιμος για φύτεμα.
- **Προετοιμασία του εδάφους:** δύο εβδομάδες πριν το φύτεμα διασκορπίζουμε Μποκάσι (το λίπασμα που έχουμε ετοιμάσει με τη χρήση ΕΜ) στο έδαφος και το σκεπάζουμε με ελαφρύ σκάψιμο(ή καλλιεργητή), αφού πρώτα το ψεκάσουμε με αραιωμένο ΕΜα(π.χ.1:100). Αν δεν μπορέσαμε να κάνουμε αυτή την προετοιμασία πριν το φύτεμα, τότε παραχώνουμε Μποκάσι ανάμεσα στις σειρές των φυτεμένων φυτών, ψεκάζοντάς το πριν με αραιωμένο Εμα.
- **Στη συνέχεια:** κάθε 14 μέρες ποτίζουμε-ψεκάζουμε με αραιωμένο ΕΜα(1: 300). Για προστασία ψεκάζουμε τα φύλλα με ΕΜ5.
- **Η συγκομοιδή** γίνεται μετά τουλάχιστον 3 βδομάδες, αφότου πεθάνουν τα φύλλα, ώστε να ωριμάσει η φλούδα για να έχουμε καλή συντήρηση. Αν θέλουμε πρώιμες πατάτες, τότε δεν χρειάζεται να περιμένουμε 3 βδομάδες.

Μετά από 2-3 χρόνια χρήσης των ΕΜ, θα; έχουμε μέχρι και 30% περισσότερη παραγωγή, καλύτερη συντήρηση και διάρκεια, καθώς και μεγαλύτερη βλαστικότητα του σπόρου, αρκεί να διατηρείται σε πολύ κρύες συνθήκες.